



SYMPTÔMES OU PROBLÈMES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE VUS CHEZ OPTION PREMIÈRE LIGNE

****BIEN LIRE AVANT DE PRENDRE RENDEZ-VOUS****

**** SI VOUS JUGEZ QUE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ EST INQUIÉTANT ET QUE VOUS
NE POUVEZ PAS ATTENDRE LE RENDEZ-VOUS, DIRIGEZ-VOUS VERS LA SALLE
D'URGENCE****

VOUS DEVEZ ÊTRE VUS EN URGENCE SI:

Tête et cou

- Étourdissements/vertiges nouveaux, en continue et persistants, avec ou sans mal de tête, fièvre, faiblesse, perte d'audition subite, confusion, signes d'AVC, engourdissements;
- Mal de tête intense, nouveau avec ou sans symptômes d'AVC, engourdissements, changement de vision, vomissement associé;
- Commotion cérébrale suspectée < 1 semaine (1^{ère} évaluation);
- Douleur aux yeux avec ou sans rougeur, sensation de corps étranger, changement de la vision;
- Perte de conscience avec ou sans malaise, faiblesse < 2 semaine;
- Forte fièvre ou atteinte de l'état générale malgré un début d'antibiotique déjà prescrit quelques jours avant;
- Faiblesses généralisées ou musculaires importantes récentes < 2 semaines;

Système digestif et abdomen

- Douleur au ventre nouvelle, avec ou sans fièvre, avec ou sans diarrhée < 2 semaines;
- Incapacité à s'hydrater avec ou sans atteinte importante de l'état générale > 48h;
- Vomissements avec du sang;
- Diarrhée très importante avec faiblesse;
- Selles noires nouvelle < 2 semaines (et non-reliée aux effets secondaires de certains médicaments tels que des suppléments de fer ou du *pepto-bismol* entre-autres);
- Saignement vaginal important inhabituel < 1 semaine;

Thorax, respiration et cœur

- Difficulté importante à respirer;
- Douleur à la poitrine nouvelle < 2 semaines;
- Palpitations soutenues avec ou sans malaise < 2 semaines;
- Crachats de sang;

Autres conditions générales de santé

- Bébés < 3 mois avec fièvre;
- Toutes conditions de santé fragiles qui nécessitent des investigations et des soins rapidement;
- Fatigue très importante/accablante;
- Incapacité à uriner;
- Grossesse ou suspicion d'avortement; Pas de suivi de grossesse périodique.
- Morsures ou plaies;
- Propos ou tentative de suicide;
- Fracture évidente ou forte suspicion de fracture, trauma ou chute qui nécessite plusieurs investigations rapidement.